



LABORATOIRES

Pierre Fabre

Innovative Oncology

**Taking care,
living better**



nerlynx®
(Neratinib)

HER2+/HR+?

Stadium II / III?

Nerlynx mit
Patientin
besprechen

REZIDIVRISIKO BEI BRUSTKREBS*:

NUTZEN SIE ALLE THERAPIEOPTIONEN

* frühes HER2+/HR+ Mammakarzinom

Kontakt:

Emmanuelle Eder

Emmanuelle.eder@pierre-
fabre.com
+49 1727006461



Nerlynx® 40 mg Filmtabletten. Wirkstoff: Neratinib. **Zusammensetzung:** 1 Filmtablette enthält 40 mg Neratinib (als Neratinibmaleat). Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: Mannitol (E421), mikrokristalline Cellulose, Crospovidon, Povidon, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat. Tablettenüberzug: Poly(vinylalkohol), Titandioxid (E171), Macrogol, Talkum, Eisen(III)-oxid (E172). **Anwendungsgebiete:** Nerlynx ist indiziert für die erweitertheadjuvante Behandlung von erwachsenen Patienten mit Hormonrezeptor-positivem, HER2-überexprimiertem/amplifiziertem Brustkrebs in einem frühen Stadium, die vor weniger als einem Jahr eine Trastuzumab-basierte adjuvante Therapie abgeschlossen haben. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Gleichzeitige Verabreichung von starken CYP3A4-/P-gp-Induktoren. Schwere Leberinsuffizienz (Child Pugh C). **Nebenwirkungen:** sehr häufig: Appetitlosigkeit, Durchfall, Erbrechen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Schmerzen im Oberbauch, Stomatitis, Hautausschlag, Muskelkrämpfe, Ermüdung. häufig: Harnwegsinfektionen, Dehydratation, Synkope, Epistaxis, Völlegefühl, trockener Mund, Dyspepsie, erhöhte Alaninaminotransferase, erhöhte Aspartataminotransferase, Nagelerkrankungen, rissige und trockene Haut, erhöhtes Blutkreatinin, Gewichtsabnahme. gelegentlich: erhöhte Bilirubin-Konzentration im Blut, Niereninsuffizienz. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht das Trockenmittel verschlucken. **Verschreibungspflichtig.** Weitere Hinweise: siehe Fachinformation.
Stand: 05/2023. Pierre Fabre Pharma GmbH, Neuer Messplatz 5, 79108 Freiburg

nerlynx®
(neratinib)